

| Traitements  | Classe   | Effets indésirables les plus fréquents  | Associations contre-indiquées  | Recommandations & commentaires  |
|--|--|---|--|---|
| <b>APTIVUS®</b><br>(TPV tipranavir)<br><br>2 gélules, 2 fois/jour<br><br>Boehringer - AMM du 23/10/05<br>révision le 23/06/09  | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarrhées</li> <li>• Éruptions cutanées</li> <li>• Troubles digestifs</li> <li>• Hyperglycémie</li> <li>• Hypertriglycéridémie</li> <li>• Hypercholestérolémie.</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre au moment du repas. Prendre ce traitement au moment du coucher peut minimiser les effets indésirables.</li> <li>- Associé à 2 capsules de ritonavir, à chaque prise.</li> </ul>  |
| <b>ATRIPLA®</b><br>(efavirenz/emtricitabine/tenofovir)<br><br>1 comprimé, 1 fois/jour<br><br>BMS/GILEAD - AMM du 13/12/07<br>révision le 31/08/09                    | NUCLÉOSIDE, NUCLÉOTIDE ET NON NUCLÉOSIDE                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acidose lactique • problème au foie</li> <li>• Problèmes psychiatriques</li> <li>• dépression • vertiges • nausées</li> <li>• diarrhées • fatigue • maux de tête</li> <li>• érythème • sinusite • insomnie</li> <li>• rêves inhabituels.</li> </ul>  | Astemizole, cisapride, midazolam, triazolam, dérivés de l'ergot, voriconazole, methysergide, ergotamine, dihydroergotamin mesylate, millepertuis officinal, efavirenz, emtricitabine, tenofovir, atazanavir, lamivudine. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surveiller les fonctions hépatiques et rénales.</li> <li>- À prendre à jeun.</li> <li>- En cas de troubles psychiques, en parler à son médecin.</li> <li>- Agit aussi contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection.</li> <li>- Contre indiqué durant la grossesse.</li> </ul>   |
| <b>CESENTRI®</b><br>(MVC maraviroc)<br><br>1 comprimé, 2 fois/jour (sauf exception)<br><br>Pfizer - AMM du 24/09/07<br>révision le 07/08/09                          | INHIBITEUR D'ENTRÉE                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toux • fièvre • infections pulmonaires • éruptions cutanées</li> <li>• douleurs musculaires et abdominales</li> <li>• étourdissement • constipation</li> <li>• démangeaisons • difficulté à dormir.</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi hépatique attentif, pour cause de réaction allergique.</li> <li>- Suivi attentif pour risque d'infection herpétique.</li> </ul>  |
| <b>COMBIVIR®</b><br>(3TC/AZI)<br><br>1 comprimé, 2 fois/jour<br><br>GSK - AMM du 18/03/98<br>révision le 02/04/09  | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acidose lactique : devant être traitée d'urgence ; symptômes : essoufflement, fatigue importante et inexplicquée, douleurs musculaires, crampes, nausées, vomissements • Lipoatrophie</li> <li>• Nausées importantes qui disparaissent progressivement.</li> </ul>   | Stavudine, ribavirine, zalcitabine, emtricitabine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi hématologique régulier.</li> <li>- La lamivudine agit aussi contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection, aussi bien à l'initiation qu'à l'arrêt du traitement.</li> </ul>  |
| <b>CRIVAN®</b><br>(IDV indinavir)<br><br>2 gélules, 2 fois/jour<br><br>MSD - AMM du 04/10/96<br>révision le 14/07/09   | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calculs rénaux • Troubles digestifs</li> <li>• Sensations anormales autour de la bouche • Sécheresse cutanée • Perte de cheveux • Hypertriglycéridémie</li> <li>• Hypercholestérolémie</li> <li>• Hyperglycémie • Lipodystrophie</li> <li>• Ongles incarnés.</li> </ul>  | Rifampicine, astémizole, millepertuis, cisapride, dérivés de l'ergot de seigle, terféndine, ethinyloestradiol.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre à jeun avec de l'eau, sauf si pris avec du ritonavir, et à 1h de distance du Videx®.</li> <li>- Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour pour éviter des calculs rénaux.</li> <li>- Effets secondaires très importants. A éviter à l'initiation d'un traitement.</li> </ul>   |
| <b>EMTRIVA®</b><br>(FTC emtricitabine)<br><br>1 gélule/jour<br><br>Gilead - AMM du 24/10/03<br>révision le 18/06/09  | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risque d'acidose lactique</li> <li>• Maux de tête, vertiges • Fatigue</li> <li>• Troubles digestifs • Eruption cutanée</li> <li>• coloration de la paume des mains.</li> </ul>   | Lamivudine, zalcitabine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'emtricitabine agit aussi contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection, aussi bien à l'initiation qu'à l'arrêt du traitement.</li> </ul>   |
| <b>EPIVIR®</b><br>(3TC lamivudine)<br><br>1 comprimé/jour<br><br>GSK - AMM du 08/08/96<br>révision le 05/09/08   | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles digestifs</li> <li>• Maux de tête</li> <li>• Fatigue.</li> </ul>  | Zalcitabine, emtricitabine.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La lamivudine agit aussi contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection, aussi bien à l'initiation qu'à l'arrêt du traitement.</li> </ul>   |
| <b>FUZEON®</b><br>(T20 enfuvirtide)<br><br>Injection sous-cutanée, 2 fois/jour<br><br>Roche - AMM du 27/05/03<br>révision le 08/07/08                                | INHIBITEUR DE FUSION                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Au niveau du site d'injection : rougeurs, douleurs, petites boules.</li> </ul>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Après reconstitution du produit avec de l'eau fournie, peut se conserver 24h maxi, au réfrigérateur.</li> <li>- Changer régulièrement de site d'injection et masser immédiatement après l'injection.</li> </ul>  |
| <b>INTELENCE®</b><br>(TMC 125 étravirine)<br><br>2 comprimés, 2 fois/jour<br><br>Tibotec - AMM du 26/06/08<br>révision le 03/08/09                                   | INHIBITEUR NON NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête</li> <li>• Nausées</li> <li>• Diarrhées</li> <li>• Rash.</li> </ul>   |  | À prendre au cours du repas.  |
| <b>INVIRASE®</b><br>(SQV saquinavir)<br><br>2 comprimés, 2 fois/jour<br><br>Roche - AMM du 04/10/96<br>révision le 28/07/10  | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarrhées</li> <li>• Lipodystrophie</li> <li>• Hyperglycémie</li> <li>• Hypertriglycéridémie</li> <li>• Hypercholestérolémie.</li> </ul>   | Carbamazépine, efavirenz, névirapine, phénobarbital, phénytoïne, primidone, rifabutine, rifampicine, astémizole, cisapride, terféndine, atazanavir.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre avec un repas copieux.</li> <li>- Associé au ritonavir en faible dose, indispensable pour garantir une efficacité suffisante.</li> <li>- La posologie d'Invirase® dépend du dosage plasmatique effectué après 2 semaines de traitement.</li> </ul>   |
| <b>ISENTRESS®</b><br>(MK 0518 raltegravir)<br><br>1 comprimé, 2 fois/jour<br><br>MSD - AMM du 20/12/07<br>révision le 09/09/09                                       | INHIBITEUR D'INTÉGRASE                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête</li> <li>• Fatigue</li> <li>• Vertiges.</li> </ul>  |  |   |
| <b>KALETRA®</b><br>(LPV.r/lopinavir + ritonavir)<br><br>2 comprimés, 2 fois/jour ou 4 comprimés, 1 fois/jour<br><br>Abbott - AMM du 20/03/01<br>révision le 21/08/09 | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarrhées • Nausées • Vomissements</li> <li>• Éruptions cutanées • Fatigue</li> <li>• Lipodystrophie • Hyperglycémie</li> <li>• Hypertriglycéridémie</li> <li>• Hypercholestérolémie.</li> </ul>   | Astémizole, terféndine, flécaïnide, midazolam, triazolam, cisapride, primozide, amiodarone, dérivés de l'ergot de seigle, millepertuis, rifampicine, disulfirame, propafénone, métronidazole.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contre-indiqué en cas d'insuffisance hépatique sévère.</li> <li>- Contient du ritonavir, comme booster.</li> <li>- À prendre à 1h de distance du Videx®.</li> </ul>  |
| <b>KIVEXA®</b><br>(abacavir/lamivudine)<br><br>1 comprimé/jour<br><br>GSK - AMM du 17/09/04<br>révision le 08/06/09  | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatigue • Troubles digestifs</li> <li>• Risque d'allergie grave surtout les 1<sup>ers</sup> mois; symptômes : rougeurs cutanées, fatigue, démangeaisons, fièvre, nausées, vomissements, diarrhées, courbatures, malaise général, maux de gorge, toux, sensation d'essoufflement</li> <li>• Risque d'acidose lactique devant être traitée d'urgence (voir Combivir®)</li> <li>• Troubles digestifs • Maux de tête.</li> </ul> | Zalcitabine, stavudine, emtricitabine, alcool (éthanol), ne pas débiter le traitement en même temps que névirapine.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La lamivudine agissant contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection.</li> <li>- Non recommandé en cas de grossesse et d'insuffisance hépatique.</li> <li>- En cas d'hypersensibilité même sans éruption cutanée : contacter les urgences avec la notice de la boîte.</li> <li>- En cas d'arrêt du traitement, pour hypersensibilité, ne jamais reprendre l'abacavir : risque mortel.</li> </ul> |

| Traitements  | Classe   | Effets indésirables les plus fréquents   | Associations contre-indiquées  | Recommandations et commentaires  |
|--|--|--|--|--|
| <b>NORVIR®</b><br>(ritonavir)<br>6 capsules, 2 fois/jour<br>Abbott - AMM du 26/08/96   | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles digestifs, diarrhées</li> <li>• Sensations anormales autour de la bouche</li> <li>• Neuropathies périphériques</li> <li>• Hypertriglycéridémie</li> <li>• Hyperglycémie</li> <li>• Hypercholestérolémie.</li> </ul>  | Astémizole, cisapride, dérivés de l'ergot de seigle, terféridine, pimozide, rifampicine, efavirenz, midazolam, rifabutine, triazolam.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre au cours du repas.</li> <li>- Le ritonavir est recommandé à faible dose en association à une autre antiprotéase, comme booster.</li> <li>- À conserver au frais.</li> </ul>   |
| <b>PREZISTA®</b><br>(TMC 114 darunavir)<br>1 comprimé, 2 fois/jour<br>Tibotec - AMM 21/02/07<br>révision le 31/03/11                       | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maux de tête</li> <li>• Nausées</li> <li>• Diarrhées.</li> </ul>  | Terféridine, dérivés de l'ergot de seigle, millepertuis, rifampicine et certains anti-arythmiques (bépridil, quinidine).                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doit être associé à de faibles doses de ritonavir.</li> <li>- À prendre au cours du repas.</li> </ul>   |
| <b>RETROVIR®</b><br>(AZT zidovudine)<br>1 comprimé, 2 fois/jour<br>GSK - AMM du 13/03/87<br>révision le 03/04/09                           | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anémie (baisse des globules rouges)</li> <li>• Leucopénie et neutropénie (baisse des globules blancs dont neutrophiles)</li> <li>• Maux de tête</li> <li>• Fatigue</li> <li>• Chez les nouveaux-nés, risque de cytopathies mitochondriales si la mère a reçu AZT+3TC.</li> </ul>  | Stavudine, ribavirine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi sanguin pour surveiller l'apparition éventuelle d'anémie ou de neutropénie.</li> </ul>  |
| <b>REYATAZ®</b><br>(atazanavir)<br>1 gélule, 1 fois/jour<br>BMS - AMM du 02/03/04<br>révision le 07/07/09                                  | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles digestifs</li> <li>• En début de traitement, peut entraîner une jaunisse (par l'augmentation de la bilirubine sanguine)</li> <li>• Troubles de la vision.</li> </ul>   | Nombreuses interactions avec d'autres médicaments éliminés par le foie.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre au cours du repas.</li> <li>- Prévenir son médecin en cas de jaunisse.</li> <li>- Associé à une gélule de ritonavir.</li> </ul>   |
| <b>SUSTIVA®</b><br>(EFV efavirenz)<br>1 comprimé/jour<br>BMS - AMM du 28/05/99<br>révision le 20/01/10                                     | INHIBITEUR NON NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensations d'ébriété, vertiges, cauchemars, hallucinations</li> <li>• Hypercholestérolémie</li> <li>• Troubles du comportement et de l'humeur</li> <li>• Eruption cutanée parfois sévère (rash).</li> </ul>   | Saquinavir, astémizole, cisapride, midazolam, terféridine, triazolam, éthynil-oestradiol, ritonavir, névirapine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre au coucher.</li> <li>- En cas de troubles psychiques, en parler à son médecin.</li> <li>- Surveillance de la fonction hépatique.</li> <li>- Contre indiqué durant la grossesse.</li> </ul>  |
| <b>TELZIR®</b><br>(APV fosamprenavir)<br>1 comprimé, 2 fois/jour<br>GSK - AMM du 12/07/04<br>révision le 15/05/09                          | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nausées</li> <li>• Hypertriglycéridémie</li> <li>• Hypercholestérolémie</li> <li>• Hyperglycémie.</li> </ul>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de remplacer les 8 gélules quotidiennes d'amprénavir.</li> <li>- À prendre au cours du repas.</li> <li>- Doit être associé à une gélule de ritonavir, à chaque prise.</li> </ul>   |
| <b>TRIZIVIR®</b><br>(abacavir/lamivudine/zidovudine)<br>1 comprimé, 2 fois/jour<br>GSK - AMM du 28/12/00<br>révision le 27/05/09           | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allergie grave: hypersensibilité à l'abacavir (voir Ziagen®) pouvant entraîner l'arrêt du traitement</li> <li>• Effets indésirables de zidovudine (voir Rétrovir®), de lamivudine (voir Epivir®) et d'abacavir (voir Ziagen®).</li> </ul>   | Stavudine, alcool, emtricitabine, ribavirine, zalcitabine, ne pas débuter le traitement en même temps que névirapine (voir Ziagen®).                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voir Ziagen®.</li> <li>- La lamivudine agit aussi contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection, aussi bien à l'initiation qu'à l'arrêt du traitement.</li> </ul>   |
| <b>TRUVADA®</b><br>(emtricitabine/tenofovir)<br>1 comprimé/jour<br>Gilead - AMM du 21/02/05<br>révision le 22/12/08                        | NUCLÉOSIDE ET NUCLÉOTIDE                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles digestifs (vomissements, nausées, diarrhées, flatulences)</li> <li>• Fatigue</li> <li>• Diminution du phosphate sanguin</li> <li>• Maux de tête, vertiges</li> <li>• Insuffisance rénale</li> <li>• Risque d'acidose lactique</li> <li>• Possibilité d'éruption cutanée</li> <li>• Coloration de la paume des mains.</li> </ul>                                    | didanosine, antibiotiques de la famille des aminosides, foscarnet sodique, amphotéricine B, vancomycine, iséthionate de pentamidine, ganciclovir.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre au moment du repas.</li> <li>- Surveillance de la fonction rénale recommandée.</li> <li>- Le tenofovir et l'emtricitabine agissent aussi contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection, aussi bien à l'initiation qu'à l'arrêt du traitement.</li> </ul>  |
| <b>VIDEX®</b><br>(ddl didanosine)<br>1 gélule/jour<br>BMS - AMM du 05/05/92<br>révision le 11/08/09  | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles digestifs</li> <li>• Troubles hépatiques et risques de pancréatite aiguë en association avec Zérit® (arrêt immédiat)</li> <li>• Neuropathies périphériques (fourmillements et diminution de la sensibilité au niveau des pieds et des mains).</li> </ul>   | Ganciclovir, stavudine, ténofovir, zalcitabine.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigilance sur l'apparition de neuropathies périphériques.</li> <li>- Prendre à jeun strict, et à distance des autres médicaments, 2h avant ou après le repas.</li> <li>- Risque de pancréatite, surtout en cas de consommation d'alcool.</li> </ul>   |
| <b>VIRACEPT®</b><br>(NFV nelfinavir)<br>3 comprimés, 3 fois/jour<br>Roche - AMM du 22/01/98<br>révision le 06/07/08                        | INHIBITEUR DE LA PROTÉASE                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarrhées, parfois importantes</li> <li>• Lipodystrophie</li> <li>• Hyperglycémie</li> <li>• Hypertriglycéridémie</li> <li>• Hypercholestérolémie.</li> </ul>   | Rifampicine, astémizole, cisapride, dérivés de l'ergot de seigle, terféridine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre absolument durant le repas.</li> <li>- En cas de diarrhées persistantes, demander l'avis de votre médecin.</li> </ul>   |
| <b>VIRAMUNE®</b><br>(NVP nevirapine)<br>1 comprimé/jour sur 14 jours ; puis 2/jour<br>Boehringer - AMM du 05/02/98<br>révision le 29/05/09 | INHIBITEUR NON NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risque d'allergie : fièvre, éruption cutanée sévère (rash)</li> <li>• Atteintes hépatiques graves.</li> </ul>   | Saquinavir, ketoconazole, éthynil-oestradiol, rifampicine, efavirenz, ne pas débuter le traitement en même temps que l'abacavir.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contre indiqué si insuffisance hépatique sévère, d'où surveillance attentive.</li> <li>- Risques d'allergie à Viramune® pouvant atteindre la peau et le foie.</li> <li>- L'initiation doit être progressive et nécessite une surveillance accrue, surtout en cas de co-infection.</li> </ul>                            |
| <b>VIREAD®</b><br>(TDF tenofovir)<br>1 comprimé/jour<br>Gilead - AMM du 05/02/02<br>révision le 22/04/09                                   | INHIBITEUR NUCLÉOTIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Troubles digestifs (vomissements, nausées, diarrhées, flatulences)</li> <li>• Diminution du phosphate sanguin</li> <li>• Insuffisance rénale.</li> </ul>  | zalcitabine, didanosine, antibiotiques de la famille des aminosides, foscarnet sodique, amphotéricine B, vancomycine, iséthionate de pentamidine, ganciclovir. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- À prendre au moment du repas.</li> <li>- Surveillance de la fonction rénale recommandée.</li> <li>- Le tenofovir agit aussi contre le VHB, en tenir compte en cas de co-infection.</li> </ul>   |
| <b>ZÉRIT®</b><br>(d4T stavudine)<br>1 gélule, 2 fois/jour<br>BMS - AMM du 08/05/96<br>révision le 28/08/09                                 | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toxicité hépatique et pancréatique</li> <li>• Neuropathies périphériques</li> <li>• Troubles métaboliques : diabète, lipodystrophie, etc.</li> </ul>  | Didanosine, zidovudine, zalcitabine, doxorubicine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vigilance sur l'apparition de neuropathies périphériques.</li> <li>- Risque de pancréatite, surtout en cas de consommation d'alcool.</li> <li>- Risque majoré de lipodystrophie.</li> </ul>   |
| <b>ZIAGEN®</b><br>(ABC abacavir)<br>2 comprimés, 1 fois/jour<br>GSK - AMM du 08/07/99<br>révision le 08/06/09                              | INHIBITEUR NUCLÉOSIDIQUE DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatigue</li> <li>• Troubles digestifs</li> <li>• Risque d'allergie grave surtout les 1<sup>ers</sup> mois ; toux, symptômes: rougeurs cutanées, nausées, démangeaisons, fièvre, vomissements, diarrhées, fatigue, courbatures, malaise général, maux de gorge, essoufflement</li> <li>• Risque d'acidose lactique devant être traité d'urgence (lire Combivir®).</li> </ul> | Alcool (éthanol), ne pas débuter le traitement en même temps que névirapine.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non recommandé chez la femme enceinte, et si insuffisance hépatique.</li> <li>- En cas d'hypersensibilité : contacter le médecin ou les urgences avec l'avertissement fournie dans la boîte.</li> <li>- En cas d'arrêt du traitement, pour hypersensibilité, ne jamais reprendre l'abacavir : risque mortel.</li> </ul> |