

# Les femmes et le VIH

## Situation épidémiologique

Unité VIH/Sida – IST-VHC  
Département des Maladies Infectieuses  
Institut de veille sanitaire




# La vulnérabilité des femmes


- **biologique** : risque de transmission du VIH lors d'un rapport vaginal entre un homme contaminé et une femme > rapport vaginal entre une femme contaminée et un homme  
*0,15% versus 0,09% [Downs, 1996]*
- **socio-économique** : ignorance du VIH/sexualité, violence sexuelle, difficultés d'accès à la prévention, dépendance financière, etc.
- **clinique** : effets secondaires + fréquents (lipo-hypertrophies)

# Les femmes touchées par le VIH dans le monde

Estimated number of women and men (15-49) living with HIV/AIDS by region for 2003 (as of 21 June 2004)



# Les femmes touchées par le VIH en Europe de l'Ouest



Proportion de femmes parmi  
les nouveaux diagnostics VIH en 2003

Source : EuroHIV


15/03/2005

# **Les femmes et le VIH**


## **données épidémiologiques disponibles en France début 2005**

- ✓ **Cas de sida depuis 1982**
- ✓ **Nouveaux diagnostics VIH depuis 2003**
- ✓ **Données sur le dépistage du VIH dans les CDAG**
- ✓ **Etude sur le parcours socio-médical des personnes séropositives originaires d'Afrique sub-saharienne**
- ✓ **Synthèse**

# Evolution du nombre de nouveaux cas de sida selon le sexe




# Evolution du nombre de nouveaux cas de sida chez les femmes par mode de transmission




# Evolution du nombre de nouveaux cas de sida chez les femmes en fonction de leur nationalité


Nb de cas de sida




# Evolution du nombre de nouveaux cas de sida chez les femmes étrangères en fonction de leur nationalité




# Age moyen au moment du diagnostic de sida selon le sexe et la nationalité




# Proportion de femmes ayant un nombre de CD4<200 au diagnostic de sida



# Proportion des principales pathologies inaugurales de sida en 2003 chez les femmes selon la nationalité




# Proportion de pneumocystoses inaugurales de sida chez les femmes




Source : InVS, France données au 31.03.2004


# Proportion de candidoses oesophagiennes inaugurations de sida chez les femmes




# Proportion de toxoplasmoses cérébrales inaugurales de sida chez les femmes




# Proportion de tuberculoses inaugurations de sida chez les femmes




# Nombre de cas de sida par année de diagnostic en fonction de la connaissance ou non de la séropositivité et de l'éventualité d'un traitement anti rétroviral avant le sida



# Nombre de cas de sida par année de diagnostic en fonction de la connaissance ou non de la séropositivité et de l'éventualité d'un traitement anti rétroviral avant le sida



## Proportion de femmes en activité professionnelle ou non au diagnostic de sida en 2003 selon la nationalité




# **Les Femmes et le VIH**

## **données épidémiologiques disponibles en France début 2005**

- ✓ **Cas de sida depuis 1982**
- ✓ **Nouveaux diagnostics VIH depuis 2003**
- ✓ **Données sur le dépistage du VIH dans les CDAG**
- ✓ **Etude sur le parcours sociomédical des personnes séropositives originaires d'Afrique subsaharienne**
- ✓ **Synthèse**

# Répartition par sexe


Nouveaux diagnostics d'infection VIH  
2003 et 2004 (1er trimestre)



# Répartition par sexe et âge

## Nouveaux diagnostics d'infection VIH

### 2003 et 2004 (1er trimestre)




# Mode de contamination selon le sexe

Nouveaux diagnostics d'infection VIH


2003 et 2004 (1er trimestre)

Femmes



N = 1 429

Hommes



N = 1 920

■ Hétérosexuels

■ Homosexuels

■ UDI


■ Autres, indet.

# Répartition par nationalité selon le sexe

Nouveaux diagnostics d'infection VIH

2003 et 2004 (1er trimestre)

Femmes




N = 1 429

France

Afrique subsah.

Hommes



N = 1 920

Afrique du Nord


Autres

Inconnu


# Répartition des femmes par nationalité

Nouveaux diagnostics d'infection VIH

2003 et 2004 (1er trimestre)



# Les femmes d'Afrique subsaharienne touchées par le VIH en Europe



Source : EuroHIV

# Autres caractéristiques des femmes

Nouveaux diagnostics d'infection VIH

2003 et 2004 (1er trimestre)

- ✓ **Motifs de dépistage les plus fréquents :**
  - ✓ Chez les femmes africaines : signes cliniques/biologiques (24%)  
et grossesse (21%)
  - ✓ Chez les femmes françaises : signes cliniques/biologiques (34%)
  
- ✓ **Proportion de contaminations datant de moins de 6 mois :**
  - ✓ Chez l'ensemble des femmes ayant accepté la réalisation du test  
d'infection récente : 29%
  - ✓ Chez les femmes africaines : 20% (110/549)
  - ✓ Chez les femmes françaises : 42% (102/243)

# **Les femmes et le VIH**


## **données épidémiologiques disponibles en France début 2005**

- ✓ **Cas de sida depuis 1982**
- ✓ **Nouveaux diagnostics VIH depuis 2003**
- ✓ **Données sur le dépistage du VIH dans les CDAG**
- ✓ **Etude sur le parcours sociomédical des personnes séropositives originaires d'Afrique subsaharienne**
- ✓ **Synthèse**

# Population fréquentant les Consultations de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG)

- ✓ Les CDAG ont réalisé près de 300 000 sérologies en 2003 (près de 100 000 pour l'Ile-de-France)
- ✓ 45% des personnes testées sont des femmes
- ✓ Taux de sérologies positives : 5,1 ‰ (9,2 ‰ en Ile de France)
- ✓ 38% des sérologies positives concernent des femmes

# Evolution des tests VIH positifs dans les CDAG (‰)



# **Les femmes et le VIH**

## **données épidémiologiques disponibles en France début 2005**


- ✓ **Cas de sida depuis 1982**
- ✓ **Nouveaux diagnostics VIH depuis 2003**
- ✓ **Données sur le dépistage du VIH dans les CDAG**
- ✓ **Etude sur le parcours sociomédical des personnes séropositives originaires d'Afrique subsaharienne**
- ✓ **Synthèse**

# Parcours sociomédical des personnes originaires d'Afrique subsaharienne atteintes par le VIH, en Ile-de-France, 2002

- ✓ Etude réalisée en 2002 dans 16 services hospitaliers auprès de 250 personnes (64% de femmes) VIH+ originaires d'Afrique subsaharienne
- ✓ Population en situation de précarité :
  - 47% sans activité professionnelle
  - 52% avec des logements précaires
  - 76% avec un revenu < au SMIC
- ✓ Trois groupes identifiés par rapport à la date d'arrivée en France

# Parcours sociomédical des personnes originaires d'Afrique subsaharienne atteintes par le VIH, en Ile-de-France, 2002

(Etude par analyse de correspondances multiples)



# Parcours sociomédical des personnes originaires d'Afrique subsaharienne atteintes par le VIH, en Ile-de-France, 2002

## 3 groupes identifiés

- Hommes venus en France depuis longtemps  
intégration plutôt réussie (travail, sécurité sociale)
- Femmes venues en France entre 1988 et 1998 pour rapprochement familial  
femmes jeunes  
bénéfice de l'intégration des personnes rejointes (logement stable)
- Personnes venues en France depuis 1999 (hommes et femmes) plus souvent pour raisons médicales  
grande précarité

# Synthèse (1)

## Les femmes et le VIH

- ✓ **A l'échelle mondiale**, un peu moins de la moitié de toutes les personnes vivant avec le VIH sont de sexe féminin. Dans la plupart des régions, une proportion croissante des personnes vivant avec le VIH sont des femmes ou des jeunes filles.
- ✓ **L'Afrique** regroupe plus des trois quarts des femmes séropositives (source Onusida).

# Synthèse (2)

## Les femmes et le VIH

- ✓ **En France**, les données épidémiologiques montrent aussi une féminisation de l'épidémie :
  - ✓ Importance croissante des femmes parmi les cas de sida (29% en 2003)
  - ✓ Proportion importante de femmes parmi les nouveaux diagnostics VIH (43% en 2003/2004)
  - ✓ Proportion de femmes dépistées VIH+ en augmentation dans les CDAG
  - ✓ Il s'agit principalement de femmes d'Afrique sub-saharienne contaminées par rapports hétérosexuels
- ✓ **Les autres pays européens** observent le même phénomène (Royaume Uni, Belgique, Suède, Danemark).

# Synthèse (3)

## Les femmes et le VIH

- ✓ **Les femmes d'Afrique subsaharienne** représentent plus de la moitié des nouveaux diagnostics VIH chez les femmes en 2003/2004
  - ✓ Elles sont plus jeunes que les femmes françaises
  - ✓ Plus des trois quarts de ces femmes sont sans activité professionnelle
  - ✓ La pathologie inaugurale de sida est fréquemment une tuberculose
  - ✓ Elles sont plus souvent dépistées lors d'une grossesse et ont un accès tardif au dépistage
    - ✓ parmi les diagnostics de sida en 2003 chez des femmes africaines, 64% ne connaissaient pas leur séropositivité VIH
    - ✓ La proportion de contaminations récentes est plus faible chez les femmes africaines (20%)
- ✓ **Le nombre de femmes françaises** qui ont découvert leur séropositivité en 2003 est faible (300 femmes), la contamination par l'usage de drogues est devenue marginale